

integrus, tarsorum articulis cunctis longioribus quam latioribus. Processus prosternalis ut apud genus Micipsa longitudinaliter excavatus, utrinque pulvinatus, ultra coras ductus, immarginatus; pleuris subtilissime dense rugulatis. Abdomen remote subtiliter punctulatum.

Insecte très différent des *Tentyria*, offrant un peu l'aspect du *Thruistoraulus leptoderus* Kr. (d'Égypte et du Sinaï), mais se rapprochant davantage des *Micipsa* par son pronotum presque contigu aux élytres, remarquable au surplus (fig. 1) par le développement des yeux et de l'ensemble de la tête, l'épistome tronqué, le labre très apparent, l'extrême élongation des membres et le très petit volume du dernier article des antennes. Ses caractères analytiques sont approximativement ceux du genre *Tentyronota* Reitt., fondé sur le *Micipsa rotundicollis* Kr. (*Gastonis* Fairm.), insecte du Sahara algérien [Laghouat], beaucoup plus grand (13-16 mm.), que je ne connais pas en nature. Mais il n'est pas certain que l'espèce décrite ici appartienne réellement à ce genre, où je ne la place qu'avec hésitation et provisoirement.

Descriptions de deux *Telephanus* de la Jamaïque [COL. CUCUJIDAE]

par A. GROUVELLE.

***Telephanus strictus*, n. sp.** — *Oratus, plus quater longior quam in maxima latitudine latior, convexus, nitidulus, subsordide testaceus; capite, prothorace et elytrorum regione scutellari plus minusve rufescentibus. Antennae graciles; articulis 2 et 3 subaequalibus, circiter duplo longioribus quam latioribus. Caput tam longum quam latum, dense punctulatum, punctis subelongatis; stria interantennali rufescente arcuata, lateribus ante oculos rotundatis. Prothorax basin versus angustatus, elongatulus; lateribus antice parallelis, basin versus arcuatis, obtusissime denticulatis; basi subpulvinato-marginata. Elytra basi medio truncata, utrinque arcuata, humeris rufescentibus angulosa, lateribus subarcuata, rufescentibus ampliata, apice subconjunctim truncata, plus ter longiora quam simul in maxima latitudine latiora; tenuiter punctato-striata; striae juxta apicem evanescentibus; intercallis in disco quam punctis paulo latioribus.* — Long. 4,5 mm.

Ovale, environ quatre fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, médiocrement convexe, déprimé sur le disque des élytres, un peu brillant, testacé légèrement rembruni, à peine un

peu plus rembruni sur la tête, le prothorax et sur les extrêmes marges suturales; pubescence flave et fine, inclinée, un peu allongée sur les élytres. Antennes grêles; 1^{er} article environ cinq fois plus long que large; 2^e et 3^e subégaux, environ deux fois plus longs que larges; 5^e à 11^e s'épaississant très faiblement et progressivement vers l'extrémité; 4^e à 6^e subégaux, presque trois fois plus longs que larges, 7^e à 9^e et 11^e subégaux, un peu plus courts que les précédents, 10^e un peu plus court que le 9^e et le 11^e. Tête environ aussi longue que large au niveau des yeux, assez convexe, très finement alutacée; ponctuation très fine, un peu allongée, médiocrement serrée; épistome légèrement surbaissé par rapport au front, séparé de celui-ci par une strie à peine arquée; bords antérieurs des orbites parallèles; courbure des yeux continuant la courbure des côtés de la base de la tête; tempes non marquées. Prothorax rétréci à la base, un peu moins large en avant que la tête avec les yeux, nettement plus long que large en avant, très largement subtronqué au bord antérieur, arqué aux extrémités; angles antérieurs obtus, armés d'un très petit denticule; côtés subparallèles dans la partie antérieure, arqués, convergents dans la partie basilaire, subsinués près de la base, armés de quelques denticules à peine saillants, émoussés; angles postérieurs obtus; base subtronquée, bordée par un bourrelet large, peu accentué. Ponctuation serrée, intervalles des points très finement alutacés; marge antérieure étroitement lisse. Écusson transversal, largement arrondi au sommet. Élytres subtronqués à la base, arqués aux extrémités de chaque côté de la base du prothorax, arrondis à peine dentés aux épaules, alors environ une fois et demie plus larges que le prothorax à la base, faiblement arqués sur les côtés, très faiblement élargis, présentant leur plus grande largeur vers le milieu de la longueur, subtronqués ensemble à l'extrémité, plus de trois fois plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, finement ponctués-striés; stries ponctuées effacées contre le sommet, intervalles des stries à peine visiblement pointillés, un peu plus larges que les points des stries. Denticules des côtés du prothorax portant un long poil. Marges latérales des élytres également frangées de quelques longs poils.

Jamaïque. 1 exemplaire. Collection du British Museum.

Telephanus cribratus, n. sp. — *Oculus, paulo minus quater longior quam in maxima latitudine lator, convexus, nitidulus, subpicco-testaceus; capite prothoraceque subrufo-testaceis. Antennae graciles; articulis 2^o et 3^o subaequalibus, paulo plus duplo longioribus quam latoribus. Caput subtransversum, subdense punctulatum; stria inter-*

antennali recta; temporibus indicatis. Prothorax basin versus angustatus, subtransversus, subdense punctatus; lateribus antice parallelis, obtuse denticulatis. Elytra basi arcuata, humeris late rotundata, lateribus arcuata, sat ampliata, apice conjunctim latissime subacuminata, circiter 2 1/3 longiora quam simul in maxima latitudine latiora, precipue ad basin subvalde punctato-striata; striis apicem versus attenuatis, intervallis in disco quam punctis paulo angustioribus. — Long. 4,2 mm.

Ovale, un peu plus de trois fois et demie plus long que large dans sa plus grande largeur, convexe, un peu brillant, testacé légèrement teinté de nuance de poix sur les antennes, les élytres et les pattes, testacé légèrement rougeâtre sur la tête et sur le prothorax; pubescence flave et fine, inclinée, assez allongée sur les élytres. Antennes grêles; 1^{er} article presque six fois plus long que large; 2^e et 3^e subégaux, un peu plus de deux fois plus longs que larges; 4^e à 11^e à peine sensiblement épaissis vers l'extrémité, 4^e à 6^e subégaux, plus de trois fois plus longs que larges, 7^e à 10^e subégaux, plus courts que les précédents; 11^e plus de trois fois plus long que large, acuminé à l'extrémité. Tête un peu moins longue que large avec les yeux, faiblement convexe sur le front, à peine visiblement alutacée. Ponctuation plus serrée et plus forte sur l'occiput; points un peu allongés; épistome surbaissé par rapport au front, séparé de celui-ci par une strie droite, lisse; bords des orbites parallèles dans la partie antérieure; courbure des yeux ne continuant pas tout à fait la courbure des tempes; celles-ci légèrement marquées. Prothorax rétréci à la base, un peu plus large en avant que la tête avec les yeux, un peu moins long que large en avant. Bord antérieur arqué; angles antérieurs arrondis, armés chacun de deux denticules très petits; côtés subparallèles en avant, convergents dans la partie basilaire, brièvement subsinués et denticulés un peu en avant de la base, armés de quelques denticules à peine saillants, émoussés; angles postérieurs obtus; base subtronquée, bordée par un bourrelet à peine marqué. Ponctuation serrée surtout vers les côtés, laissant contre le bord antérieur une étroite marge lisse. Écusson très transversal, largement arrondi au sommet, lisse. Élytres brièvement tronqués à la base, largement arrondis aux épaules, alors deux fois plus larges que le prothorax à la base, arqués sur les côtés, assez élargis, présentant leur plus grande largeur un peu avant le milieu de la longueur, obliquement subtronqués et très largement subacuminés ensemble au sommet, environ deux fois et un tiers plus longs que larges ensemble dans leur plus grande largeur, assez fortement striés-ponctués; stries ponctuées atténuées vers le sommet;

intervalles plus étroits que les points des stries, ponctués d'une ligne de petits points placés en face des intervalles des points des stries. Marges latérales fortement infléchies; 1^{re} strie latérale forte; premier intervalle latéral plus large que les points des stries

Jamaïque. 2 exemplaires. Collection du British Museum.

Descriptions de trois nouveaux *Scaphidium* d'Australie

[COL. SCAPHIDIDAE]

par Julien ACHARD.

Scaphidium australe, n. sp. — Oblong, assez allongé, régulièrement atténué aux deux extrémités, avec la partie la plus large un peu en arrière des épaules, peu convexe en dessus.

Tête rousse, un peu plus claire sur le museau, lisse et brillante; yeux grands, rapprochés sur le front, profondément échancrés. Antennes rousses, avec les cinq derniers articles noirs; premier et deuxième articles légèrement épaissis, les trois suivants très grêles et allongés, sixième plus court et un peu épaissi au sommet, les cinq derniers progressivement transverses et comprimés. Prothorax rétréci en ligne droite, brillant, avec des traces d'un pointillé très superficiel et une ligne arquée de points peu serrés légèrement interrompue en son milieu, roux avec une étroite bordure antérieure, la partie comprise entre la ligne arquée et la base, une petite macule sur chaque bord latéral et deux larges bandes discales noires. Écusson petit, noir. Élytres lisses et brillants avec quelques traces d'un pointillé épars, noirs avec le bord latéral et deux étroites bandes transversales fauves; la première bande, qui commence à l'écusson et se termine derrière l'épaule, est légèrement ondulée, la seconde, placée au quart postérieur, est droite, élargie au bord marginal et prolongée, près de la suture, par un rameau perpendiculaire qui atteint presque l'angle apical. Strie suturale nette et entière, marquée de quelques points superficiels et reliée à la strie basilaire qui est formée de gros points et atteint le calus huméral. Dessous noir brillant, avec le bord des segments abdominaux roux et le dernier segment entièrement fauve. Deux derniers segments dorsaux dépassant les élytres, fauves et ornés chacun d'une macule oblongue noire. Pattes grêles et courtes, rousses, avec le sommet des fémurs noir et les tibiai fréquemment rembrunis.